



# GESTION D'UNE CRISE D'ASTHME

SIGNES D'APPEL	CONDUITE A TENIR
<p><b>SIGNES EVOCATEURS DE CRISE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toux fréquente répétée incessante</li> <li>• respiration sifflante</li> <li>• essoufflement avec gêne respiratoire</li> <li>• l'enfant se plaint de ne pas pouvoir respirer correctement</li> <li>• sensation d'oppression</li> <li>• toux à l'effort (jeux, sports, excitation) ou toux apparaissant après l'effort.</li> <li>• modification du comportement</li> <li>• Autres signes (à remplir avec les parents) :</li> </ul> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p><b>1 - NOTER LA DATE, L'HEURE DES SIGNES ET DE LA PRISE EN CHARGE</b></p> <p><b>2 - ASSEOIR L'ENFANT AU CALME ET RECUPERER LA TROUSSE D'URGENCE</b></p> <p><b>3 - ADMINISTRER LE TRAITEMENT</b></p> <p>a) Agiter le spray bleu de bronchodilatateur  b) Enlever le bouchon  c) Adapter le spray à la chambre d'inhalation  d) Procéder ensuite selon l'âge de l'enfant</p> <p><b>Pour les enfants en crèche ou en maternelle :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garder le masque et positionnez-le de façon à bien couvrir le nez et la bouche en vérifiant qu'il n'y ait pas de fuite.</li> </ul> <p><b>Pour les enfants en élémentaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- placer l'embout dans la bouche en vérifiant que les lèvres soient bien refermées autour de l'embout.</li> <li>- si difficultés à garder l'embout en bouche, ne pas hésiter à mettre le masque par sécurité</li> </ul> <p>e) L'enfant doit inhaler <b>au total 5 bouffées de spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déclencher 1 bouffée du spray et faire 5 grandes respirations calmes pour chaque bouffée de bronchodilatateur</li> <li>- Répéter la même manœuvre 4 fois « soit 5 bouffées au total »</li> </ul> <p><b>4 - SI LES SIGNES PERSISTENT, AU BOUT DE 10 MIN RENOUELER ENCORE 5 BOUFFEES DE SPRAY / AVERTIR LES PARENTS ET APPELER LE SAMU</b></p>



<p><b>SI LES SIGNES SONT GRAVES D'EMBLEE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gêne respiratoire importante <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec difficultés pour parler</li> <li>- avec impossibilité de poursuivre toute activité</li> <li>- avec angoisse intense ou panique</li> </ul> </li> <li>• lèvres ou extrémités bleues</li> </ul>	<p><b>1 - DECLENCHER</b> une pulvérisation de spray bleu dans la chambre d'inhalation. Faites respirer l'enfant calmement 10 fois. Refaire les mêmes gestes 10 fois au total.</p> <p><b>2 - APPELER le SAMU</b> en urgence (faire le 15)</p> <p><b>3 - PREVENIR</b> les parents ou responsable légal</p>
---	--

**Informez l'infirmière et/ou médecin de PMI ou de l'E.N**